



SZPITAL UNIWERSYTECKI
W KRAKOWIE

Skrócona instrukcja dla pacjenta

Wymaz okołodbytniczy w kierunku owsicy – wymazówka parazytologiczna

1. Materiał najlepiej pobrać między godziną 22:00-23:00 w nocy lub rano, zaraz po przebudzeniu przed poranną toaletą i przed wypróżnieniem – najlepiej po spoczynku nocnym.
2. Wykonać wymaz przy użyciu specjalnego zestawu tzw. „wymazówki parazytologicznej” dostępnej w Zakładzie Mikrobiologii.
3. Wyjąć wymazówkę z pojemnika i koniec z celofanem zwilżyć letnią, przegotowaną wodą, tak aby lekko zwilżyć celofan. Nie zdejmować celofanu z wymazówki!
4. Wymazówkę wziąć do jednej ręki, a drugą ręką rozchylić fałdy odbytu. Końcem wymazówki z celofanem wymazać śluzówkę odbytu i fałdy skóry otaczające odbyt. Nie wkładać wymazówki do środka odbytnicy.
5. Wymazówkę z celofanem włożyć do pojemnika nie dotykając ścian naczynia. Pojemnik szczelnie zamknąć.
6. Pobrany materiał podpisać danymi pacjenta i dostarczyć do Punktu Pobrań w czasie do 2 godzin.