



JEDNOSTKA ZLECAJĄCA / ODBIORCA WYNIKU

DATA POBRANIA :

GODZINA POBRANIA:

PODPIS OSOBY POBIERAJĄCEJ:

Skierowanie na badanieZespół Uniwersytecki w Krakowie, Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki,Pracownia Badań Hematologicznych,ul. Kopernika 17, 31- 501 Kraków; tel.: 12 424 76 24

Imię i nazwisko pacjenta: Płeć: K / M

Miejsce zamieszkania:

PESEL: Data urodzenia:

Rozpoznanie / data rozpoznania:

Etap choroby / leczenia

Badania hematologiczne	
Morfologia (DIFF)	
Morfologia (DIFF+RET)	
Morfologia (DIFF+RET+PLTF)	
Morfologia (DIFF + RET+PLTF +HPC)	
Płytki krwi-cytrynian	
Płytki krwi - siarczan magnezu	
Leukogram-ocena mikroskopowa	
Erytrogram-ocena mikroskopowa	
Ocena trombocytów	
Ocena cytologiczna szpiku kostnego- mielogram	
FAG	
Badania cytochemiczne (POX)	
Syderoblasty	
Oporność osmotyczna erytrocytów	
Przeciwciała p/płytkowe	
Izolacja komórek jednojądrzastych	
Ocena żywotności	

Badania koagulologiczne	
Czas protrombinowy (PT)	
Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)	
Czas trombinowy (TT)	
Fibrynogen (metoda czynnościowa Claussa)	
Test korekcji	
Testy anty-Xa	
Krioglobuliny	
Kriofibrynogen	
Aktywność c1-inhibitora	
Diagnostyka układu fibrynolitycznego	
Dimer-d	
Aktywność plazminogenu	
Aktywność α2-antyplazminy	
Aktywność PAI-1	
Diagnostyka skaz krwotocznych	
Aktywność czynnika II	
Aktywność czynnika V	
Aktywność czynnika VII	
Aktywność czynnika VIII	
Aktywność czynnika IX	
Aktywność czynnika X	
Aktywność czynnika XI	
Aktywność czynnika XII	

Aktywność czynnika XIII	
Aktywność czynnika VIII (metoda chromogenna)	
Aktywność czynnika IX (metoda chromogenna)	
Inhibitor czynnika VIII (m. Bethesda w modyfikacji Nijmegen)	
Inhibitor czynnika IX (m. Bethesda w modyfikacji Nijmegen)	

Agregacja płytek krwi pod wpływem 5 agonistów: kwasu arachidonowego, ADP, epinefryny, kolagenu, ristocetyny	
Diagnostyka choroby von Willebranda	
Aktywność czynnika von Willebranda jako kofaktora ristocetyny (vWFCo:R)	
Aktywność czynnika von Willebranda (vWF:Ac)	
Stężenie czynnika von Willebranda (vWF:Ag)	
Test LD-RIPA (podejrzenie typu 2B vWD)	
Diagnostyka nadkrzepliwości	
Aktywność antytrombiny	
Aktywność białka C	
Poziom wolnego białka S	
Stężenie białka S całkowitego	
Aktywność białka S całkowitego	
Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego	
Antykoagulant toczeniowy	
Przeciwciała antykardiolipinowe (IgG i IgM)	
Przeciwciała przeciwko β2-glikoproteinie I (IgG i IgM)	
Przeciwciała przeciwko fosfatydyloserynie (IgG i IgM)	
Przeciwciała przeciwko protrombinie (IgG i IgM)	

Data przyjęcia materiału:

Godzina przyjęcia materiału:

Pieczeń i podpis lekarz