



SZPITAL UNIWERSYTECKI  
W KRAKOWIE

I-P-ZM-02/K4

## Skrócona instrukcja dla pacjenta

### Wymaz z kału.

1. Kał należy pobrać:
  - jak najwcześniej od wystąpienia objawów (np. biegunki) lub ich nawrotu;
  - optymalnie przed podjęciem leczenia lub 2–3 tygodnie po jego zakończeniu;
  - po opróżnieniu pęcherza (kał nie może zawierać domieszki moczu);
  - w trzech kolejnych dniach, gdy wykonywane jest badanie w kierunku bakterii Salmonella;
  - trzykrotnie w odstępach 3–4 dni, gdy wykonywane jest badanie parazytologiczne;
  - w okresie nawrotu objawów.
2. Należy przygotować zestaw transportowy z wymazówką otrzymany z Zakładu Mikrobiologii oraz rękawice medyczne niesterylne.
3. Zestaw należy opisać imieniem i nazwiskiem w miejscu do tego przeznaczonym przy użyciu niezmywalnego pisaka.
4. Należy przygotować muszlę klozetową poprzez wyłożenie jej papierem toaletowym tak, aby oddany kał nie wpadł do wody w dole muszli. Kał można także oddawać do naczynia jednorazowego użytku (np. basen) lub wcześniej umytego i zdezynfekowanego naczynia wielorazowego użytku (np. basen).
5. Należy umyć ręce i założyć rękawice medyczne niesterylne.
6. Oddać kał do muszli lub naczynia.
7. Po otwarciu zestawu próbki kału pobrać natychmiast po defekacji za pomocą wymazówki z zestawu transportowego zanurzając końcówkę wacika w kilku różnych miejscach oddanego stolca. Należy uwzględnić miejsca patologiczne (krew, śluz, ropa).
8. Wymazówkę z pobranym materiałem umieścić w podłożu transportowym bez dotykania wacikiem ścianek próbowki.
9. Zdjąć rękawice i umyć ręce.
10. Pobrany materiał należy w czasie do 2 godzin dostarczyć do punktu pobrań.

PL 31-501 Kraków, ul. Mikołaja Kopernika 36,  
tel. +(48) 12 424 70 01, fax. +(48) 12 424 74 87  
[www.su.krakow.pl](http://www.su.krakow.pl)

