

**WYKAZ AKTUALNIE PROWADZONYCH BADAŃ KLINICZNYCH
Z AKTYWNA REKRUTACJĄ PACJENTÓW - STAN NA 12.10.2026 r.(III kwartał)**

KLINIKA Adres i numer kontaktowy	TYTUŁ BADANIA
Centrum Alergologii - Poradnia Alergologiczna Adres: ul. Botaniczna 3 Tel. 12 424 86 59; 12 424 86 56	Badanie kontynuacyjne fazy II/III oceniające podawany doustnie produkt PHA-022121 w leczeniu doraźnym napadów obrzęku naczynioruchowego u pacjentów z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym spowodowanym niedoborem inhibitora C1 (typu I lub typu II)
	Prowadzone metodą otwartej próby badanie oceniające donidalorsen u pacjentów pediatrycznych w wieku od 2 do mniej niż 12 lat z dziedzicznym obrzękiem
	Randomizowane, trzyczęściowe badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo podawanego doustnie deukryktybantu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w profilaktyce oraz deukryktybantu w postaci kapsułek miękkich w leczeniu doraźnym napadów obrzęku naczynioruchowego u osób dorosłych z nabytym obrzękiem naczynioruchowym spowodowanym niedoborem inhibitora C1
O/K Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Adres: ul. Kopernika 50 Tel. 12 351 66 61	Eksperyment medyczny pt. Nowe możliwości personalizowanej terapii przeciwnowotworowej w oparciu o hodowlę komórek pierwotnych od pacjenta, charakteryzując omiczną i testy funkcjonalne
O/K Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Gastroenterologicznej i Transplantologii Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 24 00	Wieloośrodkowy, otwarty eksperyment badawczy z zastosowaniem testu do diagnostyki nowotworu trzustki - u pacjentów z zdiagnozowanym rakiem trzustki oraz pacjentów z innymi niż rak trzustki chorobami nowotworowymi oraz zdrowych uczestników, mający na celu określenie swoistości i czułości badanego testu
	Prowadzone metodą otwartej próby, wieloośrodkowe, prospektywne badanie interwencyjne mające na celu ocenę roli terapii zastępczej enzymami trzustkowymi (PERT) (Creon® 35 000) u pacjentów z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki (PEI) po operacji trzustki
O/K Diabetologii, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 29-50	Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo, oparte na punktach końcowych, mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji leczenia Baxdrostatem w połączeniu z Dapagliflozyną, w porównaniu z leczeniem samą Dapagliflozyną na nerkowe punkty końcowe oraz śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych u uczestników z przewlekłą chorobą nerek (PChN) i wysokim ciśnieniem krwi
O/K Gastroenterologii, Hepatologii, Toksykologii i Chorób Wewnętrznych Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 31 50; 12 400 26 50	Porównanie monoterapii ustekinumabem, infliksymabem i terapii podwójnej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego

O/K Onkologii Adres: ul. Kopernika 50 Tel. 12 351 67 00; 12 351 66 05	Wieloośrodkowe prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo datopotamabu deruksstekanu (Dato-DXd) w monoterapii oraz w połączeniu z innymi lekami przeciwnowotworowymi u pacjentów z zaawansowanymi / przerzutowymi guzami litymi Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, badanie fazy III mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania HER2/neu peptydu GLSI-100 (GP2 + GM-CSF) u pacjentek z HER2/neu dodatnim i z chorobą resztkową lub z grupy wysokiego ryzyka PCR po neoadjuwantowej i pooperacyjnej terapii adjuwantowej opartej na trastuzumabie
O/K Onkologii Adres: ul. Kopernika 50 Tel. 12 351 67 00; 12 351 66 05	Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy Ib/II, obejmujące różne rodzaje nowotworu, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ifinatomabu derukstekanu (I-DXd) u pacjentów z nawracającymi lub przerzutowymi guzami litymi Randomizowane, wieloośrodkowe, kontrolowane placebo, badanie fazy III mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania HER2/neu peptydu GLSI-100 (GP2 + GM-CSF) u pacjentek z HER2/neu dodatnim i z chorobą resztkową lub z grupy wysokiego ryzyka PCR po neoadjuwantowej i pooperacyjnej terapii adjuwantowej opartej na trastuzumabie Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy Ib/II, obejmujące różne rodzaje nowotworu, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania ifinatomabu derukstekanu (I-DXd) u pacjentów z nawracającymi lub przerzutowymi guzami litymi Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania terapii skojarzonej lasofeksyfenem z abemacyklibem ze stosowaniem terapii skojarzonej fulwestrantem z abemacyklibem w leczeniu kobiet w okresie przed i po menopauzie i mężczyzn, z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym ER+/HER2 rakiem piersi z obecnością mutacji ESR Badanie III fazy oceniające leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem trastuzumabu-derukstekanu (T-DXd) i rilvegostomigu w porównaniu do standardowej terapii z użyciem gemcytabiny, cisplatyny i durwalumabu u pacjentów z lokalnie zaawansowanym lub uogólnionym rakiem dróg żółciowych z ekspresją HER2 Otwarte, randomizowane badanie fazy III dotyczące stosowania datopotamabu derukstekanu (Dato-DXd) w monoterapii lub w skojarzeniu z durwalumabem w porównaniu z chemioterapią z wyboru badacza (paklitaksel, nab-paklitaksel lub gemcytabina + karboplatyna) w skojarzeniu z pembrolizumabem u pacjentów z miejscowo nawrotowym, nieoperacyjnym lub przerzutowym potrójnie ujemnym rakiem piersi z ekspresją receptora PD-L1
	Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby, dwuczęściowe, adaptacyjne badanie fazy II/III oceniające stosowanie cząsteczki ro7771950 przenikającej barierę krew-mózg w porównaniu z tukatynibem, w obu przypadkach w skojarzeniu z trastuzumabem i kapecytabiną, u pacjentów z uprzednio leczonym, nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym, her2-dodatnim rakiem

O/K Onkologii
Adres: ul. Kopernika 50
Tel. 12 351 67 00; 12 351 66 05

[piersi z przerzutami lub bez przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego](#)

Dwuczęściowe badanie fazy III dotyczące stosowania LY4170156 w porównaniu z chemioterapią albo mirwetuksymabem sorawtanzyną w leczeniu raka jajnika opornego na związki platyny oraz stosowania LY4170156 w skojarzeniu z bewacyzumabem w porównaniu z chemioterapią opartą na związkach platyny w skojarzeniu z bewacyzumabem [w leczeniu raka jajnika wrażliwego na związki platyny](#)

Randomizowane, wieloośrodkowe, globalne badanie kliniczne fazy III prowadzone metodą otwartej próby, oceniające stosowanie rilvegostomigu lub durwalumabu w skojarzeniu z chemioterapią w pierwszej linii leczenia [u pacjentów z zaawansowanym nowotworem dróg żółciowych](#)

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne fazy III oceniające sonestitatug vedotin w skojarzeniu z kapecytabiną z lub bez rilvegostomigu [w leczeniu pierwszej linii pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym HER2-ujemnym i wykazującym obecność Klaudyny \(CLDN\) 18.2 gruczolakorakiem żołądka, połączenia żołądkowo-przełykowego lub przełyku](#)

Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III, oceniające stosowanie BNT327 w skojarzeniu z chemioterapią w porównaniu z placebo w skojarzeniu z chemioterapią [u pacjentów z wcześniej nieleczonym, miejscowo nawrotowym, nieoperacyjnym lub przerzutowym, potrójnie ujemnym rakiem piersi \(TNBC\), w przypadku których stwierdzono, że nie kwalifikują się do leczenia PD-\(L\)1 na podstawie braku ekspresji PD-L1 guza](#)

Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby w 3 grupach leczenia, oceniające precentabart tocentekan w skojarzeniu z bewacyzumabem albo w monoterapii w porównaniu z triflurydyną/typiracylem w skojarzeniu z bewacyzumabem [u uczestników z wcześniej leczonym przerzutowym rakiem jelita grubego](#)

Wyniki stosowania frukwintynibu w codziennej praktyce klinicznej [w przerzutowym raku jelita grubego](#) – prospektywne badanie rocznego przeżycia wolnego od progresji choroby i całkowitego przeżycia u pacjentów w Polsce.

O/K Endokrynologii,
Endokrynologii Onkologicznej i
Medycyny Nuklearnej
Adres: ul. Jakubowskiego 2
Tel. 12 400 23 00

Zastosowanie terapii tandemowej LutaPol/ItraPol (177Lu/90Y-DOTATE) jako skutecznego narzędzia w leczeniu [nowotworów neuroendokrynnych](#)

Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania [177Lu]Lu-DOTA-TATE [u pacjentów z nowo rozpoznany, zaawansowanym guzem neuroendokrynnym trzustki i przewodu pokarmowego \(GEP-NET\) stopnia G1 i G2 \(Ki 67 <10%\) z wysokim obciążeniem chorobą \(NETTER-3\)](#)

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, badanie fazy 2b mające na celu ocenę skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa produktu IMVT-1402 [u pacjentów dorosłych z chorobą Gravesa-Basedowa](#)

	Optymalizacja postępowania w łagodnym autonomicznym wydzielaniu kortyzolu – badanie wieloośrodkowe POL-MACS Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II/III mające na celu porównanie stosowania zanzalintynibu ze stosowaniem ewerolimusu u uczestników z wcześniej leczonymi, nieoperacyjnymi, miejscowo zaawansowanymi lub przerzutowymi guzami neuroendokrynnymi Randomizowane badanie fazy III prowadzone w trzech grupach (grupa Debio 4126 w warunkach podwójnie ślepej próby, grupa kontrolna otrzymująca placebo oraz grupa Debio 4126 w warunkach otwartej próby) w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Debio 4126 - działającego przez 12 tygodni preparatu oktreotydu - u pacjentów z akromegalią leczonych wcześniej analogami somatostatyny
O/K Hematologii i Chorób Wewnętrznych Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 32 00	Wieloośrodkowe, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane za pomocą placebo badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa i farmakokinetyki produktu XEMBIFY® w połączeniu ze standardowym leczeniem farmakologicznym w porównaniu z placebo w połączeniu ze standardowym leczeniem farmakologicznym w celu zapobiegania zakażeniom u pacjentów z hipogammaglobulinemią oraz nawracającymi lub ciężkimi zakażeniami związanymi z przewlekłą białaczką limfocytową z komórek B Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia nawrotu u chorych na chłoniaka DLBCL/HGBCL rozpoznanego w oparciu o monitorowanie krążącego nowotworowego DNA - badanie II fazy Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, z zastosowaniem leczenia uzupełniającego oceniające bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nawtemadlinu wraz z ruksolitynibem w porównaniu do placebo wraz z ruksolitynibem u pacjentów z mielofibrozą wcześniej nieleczonych inhibitorem JAK, u których wystąpiła niedostateczna odpowiedź na leczenie ruksolitynibem Globalne, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby, randomizowane badanie fazy III umożliwiające rejestrację produktu dotyczące stosowania olwerembatynibu (HQP1351) u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy II/III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające produkt BLU-263 w leczeniu indolentnej mastocytozy układowej Prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II oceniające stosowanie JNJ-79635322 u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem plazmocytowym, którzy otrzymali wcześniej co najmniej 3 linie leczenia, obejmujące inhibitor proteasomu, lek immunomodulujący i przeciwciało anty-CD38 Randomizowane, wieloośrodkowe, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy III, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania Cewostamabu w skojarzeniu z Pomalidomidem i Deksametazonem w porównaniu z leczeniem standardowym u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, którzy otrzymali od jednej do trzech wcześniejszych linii leczenia

O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 21 50	Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, badanie fazy III oceniające efekt stosowania Balcinrenonu/Dapagliflozyny w porównaniu do Dapagliflozyny, w przypadku ryzyka zdarzeń związanych z niewydolnością serca i śmierci sercowo-naczyniowej, u pacjentów z niewydolnością serca i zaburzeniem czynności nerek Optymalna strategia postępowania u chorych z nieskutecznie leczonym nadciśnieniem tętniczym Cewnikowa ablacja migotania przedsionków w porównaniu z ablacją węzła przedsionkowo-komorowego ze stymulacją CondUction System w przetrwałym migotaniu przedsionków i niewydolności serca
O/K Kardiologii oraz Interwencji Sercowo- Naczyniowych Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 22 50	Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane placebo badanie prowadzone w grupach równoległych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo samodzielnie podawanego przez pacjenta drogą podskórną selatogrelu w zapobieganiu śmiertelności ogólnej i leczeniu ostrego zawału mięśnia sercowego u pacjentów z niedawno przeżytym ostrym zawałem mięśnia sercowego Kluczowe, wieloośrodkowe, zaślepione, z grupą kontrolną poddaną procedurze pozorowanej, badanie dotyczące denerwacji nerek za pomocą zestawu Peregrine System™ u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym Wpływ dożylnego leczenia karboksymaltozą żelazową na śmiertelność i chorobowość z przyczyn sercowo-naczyniowych, oraz na jakość życia pacjentów z zawałem serca i towarzyszącym niedoborem żelaza
O/K Nefrologii, Dializoterapii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 28 50	Wieloośrodkowe randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną oceniające skuteczność i bezpieczeństwo ketoanalogów aminokwasów egzogennych w profilaktyce zaburzeń odżywienia w zespole nerczycowym RemiRit - Personalizowane leczenie immunosupresyjne z użyciem rituximabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń z obecnością przeciwciał ANCA - randomizowane, wieloośrodkowe badanie kliniczne Wieloośrodkowe, randomizowane badanie prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych, z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania iptakopanu (LNP023) w leczeniu pierwotnego błoniasto-rozplemowego kłębuszkowego zapalenia nerek indukowanego kompleksami immunologicznymi (IC-MPGN) Profilaktyka udaru mózgu za pomocą apiksabanu u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek w stadium 5 i migotaniem przedsionków (SACK) Takrolimus i czynniki ryzyka zaburzeń metabolizmu glukozy u pacjentów po przeszczepieniu nerki
O/K Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Adres: ul. Kopernika 38 Tel. 12 424 75 40	Wieloośrodkowe, jednoramienne badanie fazy IIIB oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i zgłaszane przez pacjenta wyniki 36-tygodniowego schematu uzupełniania leku w ramach systemu terapeutycznego uwalniającego lek w sposób ciągły do wnętrza gałki

	ocznej z wykorzystaniem ranibizumabu u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem
O/K Neurologii Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 25 50	Randomizowane badanie fazy III podwójnie zaślepione z grupą kontrolną placebo oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku DNTH103 u dorosłych z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną
	Wieloośrodkowe badanie kliniczne fazy II prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo preparatu IPN10200 w leczeniu dorosłych chorych na dystonię szyjną
	Randomizowane, podwójnie pozorowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania empasiprubarbu w porównaniu z podawaną dożylnie immunoglobuliną u osób dorosłych z wieloogniskową neuropatią ruchową
	Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, czteroramienne, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, wieloośrodkowe badanie fazy II oceniające skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancję stosowania trzech dawek podawanego doustnie inhibitora FAAH/MAGL o nazwie BMS-986368 w leczeniu spastyczności u uczestników ze stwardnieniem rozsianym
	Wieloośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy IIb z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające leczenie z zastosowaniem IMVT-1402 u dorosłych uczestników z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną (CIDP)
	Jednoramienne badanie fazy III z zastosowaniem wielokrotnych dawek, mające na celu porównanie farmakokinytyki produktów TAK-881 i HYQVIA u osób dorosłych z przewlekłą zapalną poliradikuloneuropatią demielinizacyjną
	Randomizowane, podwójnie pozorowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania podawanego dożylnie empasiprubarbu w porównaniu z podawaną dożylnie immunoglobuliną u osób dorosłych z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną
	Wieloośrodkowe, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy II oceniające bezpieczeństwo, farmakokinytykę, farmakodynamikę i skuteczność RO7268489, monoacyloglicerolowego inhibitora lipazy w leczeniu wspomagającym z okrelizumabem u pacjentów z postępującymi postaciami stwardnienia rozsianego
	Randomizowane, trzyokresowe badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, obejmujące trzy grupy leczenia, z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania nowej postaci kladrybiny podawanej doustnie w porównaniu z placebo u uczestników z uogólnioną miastenią rzekomoporażną
	Otwarte badanie fazy IB/IIA mające na celu ustalenie dawki, a następnie randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie rozszerzające, oceniające bezpieczeństwo, tolerancję i wstępną skuteczność TGD001 u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym

O/K Neurologii Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 25 50	Badanie zatytułowane "Adaptacyjne, randomizowane badanie fazy 2/3, podwójnie zaślepione i kontrolowane placebo, oceniające bezpieczeństwo i skuteczność DM199 w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego
	Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną otrzymującą placebo, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania empasiprubarbu podawanego dożylnie u osób dorosłych z przewlekłą zapalną polineuropatią demielinizacyjną
	Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z zastosowaniem placebo w grupie kontrolnej, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania remibrutynibu u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego
	Wieloośrodkowe, jednoramienne, prowadzone metodą otwartej próby badanie III fazy mające na celu ocenę bezpieczeństwa i stosowania systemu do podawania podskórnego okrelizumabu w warunkach domowych, u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym
	Prowadzone po raz pierwszy z udziałem ludzi badanie oceniające bezpieczeństwo stosowania, tolerancję oraz farmakokinetykę i farmakodynamikę wielokrotnych wzrastających dawek ALN-SOD podawanego dokanałowo u uczestników ze stwardnieniem zanikowym bocznym i mutacjami w genie SOD1
O/K Pulmonologii, Alergologii i Chorób Wewnętrznych Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 30 50	Randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane z użyciem placebo badanie fazy IIb mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i skuteczności roztworu pirfenidonu do inhalacji (AP01) u pacjentów z postępującym włóknieniem płuc (PPF)
	Ocena wpływu wyrobu medycznego do oczyszczania dróg oddechowych Simeox w połączeniu z telefizjoterapią na jakość życia i zaostrzenia chorób płucnych pacjentów cierpiących na rozstrzenie oskrzeli niezwiązane z mukowiscydozą, w porównaniu z podwyższonym standardem opieki
O/K Reumatologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 31 00	Randomizowane, kontrolowane placebo, wieloośrodkowe badanie oceniające wpływ upadacytynibu na wyniki leczenia spondyloartropatii u pacjentów z aktywnym łuszczycowym zapaleniem stawów (UP-SPOUT)
	Otwarte badanie I fazy ze zwiększeniem dawki (ELEVATE-1), mające na celu ocenę bezpieczeństwa, tolerancji, farmakokinetyki, farmakodynamiki oraz immunogenności preparatu angażującego limfocyty T CD19/CD20 u pacjentów z autoimmunologicznymi chorobami reumatycznymi (ARD) związanymi z limfocytami B
O/K Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Adres: ul. Kopernika 21a Tel. 12 424 87 06; 12 424 87 44	Ocena działania i bezpieczeństwa stosowania wyrobu medycznego MENTALIO - systemu wsparcia decyzji diagnostycznych i terapeutycznych w obszarze zdrowia psychicznego nastolatków w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji
Zakład Diagnostyki Obrazowej Adres: ul. Jakubowskiego 2 Tel. 12 400 14 00	Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania jodowych w środków kontrastowych w mammografii spektralnej w korelacji z badaniem rezonansu magnetycznego piersi u chorych z podejrzeniem raka piersi